

Vaccinazioni contro influenza, COVID-19, RSV e pneumococchi – per chi e quando?

Tabella 1. Gruppi target raccomandati per le vaccinazioni o l'immunizzazione (panoramica semplificata)

Gruppo target (livello di raccomandazione)	Influenza	COVID-19	RSV	Pneumococchi
Vedi anche: www.bag.admin.ch/...	...influenza-it	...covid-19-it	...rsv-it	...malattie-da-pneumococco
Persone anziane (vaccinazione complementare)	A partire dai 65 anni	A partire dai 65 anni	A partire dai 75 anni (attualmente non rimborsato dall'AOMS)	A partire dai 65 anni
Neonati sani e/o Lattanti sani (immunizzazione passiva o vaccinazione di base)	–	–	Anticorpi monoclonali per neonati e lattanti fino a 12 mesi per la prima stagione di RSV dopo la nascita	Neonati a partire dai 2 mesi di età Vaccinazione di recupero fino a 1 giorno prima del 5° compleanno (< 59 mesi), schema di vaccinazione in funzione dell'età
Bambini con fattori di rischio (vaccinazione o immunizzazione per i gruppi a rischio)	A partire dai 6 mesi , secondo il calendario vaccinale: Bambini prematuri per i primi due inverni dopo la nascita	A partire dai 16 anni , secondo il calendario vaccinale: Gradi definiti di immunodeficienza (tra cui neoplasie e trapianti); patologie polmonari, cardiovascolari, renali ed epatiche, nonché diabete mellito; anemia falciforme, IMC ≥ 35, trisomia 21	Anticorpi monoclonali fino a 24 mesi per i prematuri e in caso di patologie preesistenti, secondo il calendario vaccinale per i primi due inverni dopo la nascita	Dai 2 mesi secondo il calendario vaccinale: Prematuri (vaccinazione di base)
Adulti con fattori di rischio o patologie preesistenti aumentando il rischio di decorsi gravi o complicazioni (vaccinazione per i gruppi a rischio)	Persone con patologie preesistenti: Immunodeficienza (tra cui neoplasie, trapianti), malattie polmonari, cardiovascolari, neurologiche, muscolo-scheletriche,ematologiche, renali ed epatiche, asplenia, disturbi funzionali della milza, disturbi metabolici, IMC ≥ 40 Persone in case di riposo e strutture di cura		A partire dai 65 anni o dai 18 anni (in caso di rischio molto elevato), secondo le raccomandazioni di vaccinazione: Livelli definiti di immunodeficienza (tra cui neoplasie, trapianti, HIV), patologie polmonari, cardiovascolari, neurologiche, neuromuscolari, renali, ematologiche, diabete mellito, fragilità e persone in case di riposo e strutture di cura (attualmente non rimborsato dall'AOMS)	Persone con patologie preesistenti: Gradi definiti di immunodeficienza (comprese neoplasie, trapianti, HIV), patologie polmonari, cardiovascolari, renali (compresa la sindrome nefrosica) ed epatiche, diabete mellito, asplenia (compresa l'anemia falciforme), impianto cocleare, frattura/malformazione della base del cranio, fistola cerebrospinale del liquido cerebrospinale e celiachia negli adulti
Donne in gravidanza (vaccinazione per i gruppi a rischio a tutela delle donne in gravidanza o vaccinazione materna per l'immunizzazione passiva del neonato)	Durante tutta la gravidanza e le donne che hanno partorito nelle ultime 4 settimane: Per protezione della donna incinta e, indirettamente, del neonato	Con patologie preesistenti* protezione della donna in gravidanza Senza patologie preesistenti , se la vaccinazione è considerata clinicamente indicata a seguito di una valutazione individuale dei rischi e dei benefici	Donne incinte a partire dai 18 anni, dalla 32^a+0 alla 36^a+0 SG: vaccinazione materna (per l'immunizzazione passiva del neonato)	–
Persone a contatto con soggetti a rischio e Indicazione professionale	In caso di contatto regolare con le persone sopra indicate, neonati e uccelli selvatici/pollame	–	–	–

* Malattie cardiovascolari croniche, malattie respiratorie croniche, malattie renali croniche, malattie epatiche croniche, diabete mellito, obesità, malattie neurologiche e patologie che indeboliscono il sistema immunitario.

Informazioni sul rimborso dei costi delle vaccinazioni e dei vaccini da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) sono disponibili sulla pagina web dell'UFSP www.bag.admin.ch/it/vaccinazioni-profilattiche.



Tabella 2. Periodi e schemi di vaccinazione/immunizzazione consigliati

Gruppo target	influenza	COVID-19	RSV	Pneumococchi
Vedi anche: www.bag.admin.ch/...	...influenza-it	...covid-19-it	...rsv-it	...malattie-da-pneumococco
Persone anziane Adulti con fattori di rischio secondo la tabella 1	A partire dai 65 anni o con fattori di rischio Ogni anno: 1 dose da metà ottobre fino all'inizio dell'ondata di influenza Vaccini: Efluelda® (dai 65 anni), Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip® A partire dai 75 anni, o dai 65 anni con fattori di rischio aggiuntivi, privilegiare un vaccino ad alto dosaggio.	A partire dai 65 anni o con fattori di rischio Ogni anno: 1 dose in autunno (a partire da settembre) Vaccini: Comirnaty®, Spikevax®	A partire dai 75 anni o con fattori di rischio 1 dose , idealmente da ottobre a novembre , al più tardi prima dell'inizio dell'ondata di RSV Vaccini: Abrysvo®, Arexvy®, mResvia® (attualmente non rimborsato dall'AOMS)	Dai 65 anni: 1 dose Vaccini: Capvaxive®, Prevenar® 20
				Dai 18 ai 64 anni con fattori di rischio: 1 dose Vaccino: Capvaxive®
Neonati sani e/o Lattanti sani	–	–	Neonati nati da ottobre a marzo: 1 dose d'anticorpi* nella prima settimana di vita o il prima possibile dopo tale periodo. Lattanti nati da aprile a settembre: 1 dose d'anticorpo in ottobre o il prima possibile dopo tale data Anticorpi monoclonali: Nirsevimab (Beyfortus®), Clesrovimab (Enflonsia®)	3 dosi all'età di 2, 4 e 12 mesi Vaccini: Prevenar® 13, Vaxneuvance® Vaccinazione di recupero fino a 1 giorno prima del 5° compleanno (< 59 mesi), per gli schemi di vaccinazione vedi sotto
Bambini con fattori di rischio secondo la tabella 1	Prematuri a partire dai 6 mesi di età per i primi 2 inverni dopo la nascita, nonché bambini con fattori di rischio: Ogni anno: 1 dose da metà ottobre fino all'inizio dell'ondata di influenza Vaccini: Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®		Prematuri e/o con fattori di rischio , età 12 - 24 mesi secondo calendario vaccinale: 1 dose di anticorpi anche prima del loro secondo semestre invernale, in ottobre o il prima possibile dopo tale data Anticorpo monoclonale: Nirsevimab (Beyfortus®)	Prematuri e lattanti con patologia preesistente < 7 mesi: 4 dosi Schemi di vaccinazione di recupero in funzione dell'età al momento della 1ª dose: - 7-11 mesi: 3 dosi - 12-23 mesi: 2 dosi - dai 24 mesi: 1 dose Vaccini: secondo età: 2-59 mesi: Prevenar® 13, Vaxneuvance® 5-17 anni (6-17 anni off-label): Prevenar® 20, Vaxneuvance®
Donne in gravidanza	Durante tutta la gravidanza e le donne che hanno partorito nelle ultime 4 settimane: 1 dose da metà ottobre fino all'inizio dell'ondata di influenza Vaccini: Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	Durante tutta la gravidanza, preferibilmente nel 2° o 3° trimestre: 1 dose Vaccini: Comirnaty®, Spikevax®	1 dose* di vaccino materno tra la 32ª+0 e la 36ª+0 SG , se la data prevista per il parto cade tra l'inizio di ottobre e la fine di marzo Vaccino: Abrysvo®	–
Persone a contatto con soggetti a rischio e Indicazione professionale	Ogni anno: 1 dose da metà ottobre fino all'inizio dell'ondata di influenza Vaccini: Efluelda® (dai 65 anni), Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	–	–	–

* Le donne incinte dovrebbero decidere, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, se preferiscono la vaccinazione materna durante la gravidanza
o l'immunizzazione del neonato dopo la nascita con anticorpi monoclonali, al fine di proteggere il neonato (immunizzazione passiva).